

黄化葉巻病

イスラエル系統・イスラエルマイルド系統

耐病性



アニモ TY-12
アニモは、スペイン語で「元氣」を意味します。 **animo**



朝日アグリア株式会社

株式会社 武蔵野種苗園
THE MUSASHINO SEED CO.,LTD.

黄化葉巻病は総合的に防ぎましょう

アニモTY-12はトマト黄化葉巻病ウイルスに感染すると植物体内にウイルスを保毒し感染源となる可能性があります。また、ウイルスに継続して大量に感染した場合や、高温等の強いストレスがかかった場合には病徴が現れることがあります。タバコナジラミを防除したり、遮光資材を利用しハウス内温度を下げたりするなど適切な栽培管理に努めてください。特に育苗～定植直後は上記の対策を徹底してください。

アニモ TY-12

黄化葉巻病 イスラエル系統 イスラエルマイルド系統 耐病性

特 徴

1. 9大病害に強い

トマト黄化葉巻病に耐病性のほか、葉かび病(Cf-9)、萎ちょう病レース1、レース2、根腐れ萎ちょう病、半身萎ちょう病レース1、斑点病、ネコブセンチュウ、トマトモザイクウイルス病(Tm-2^a型)に耐病・耐虫性。

2. 着果が安定

草勢は中程度、葉はコンパクトで栽培管理しやすい。果形は腰高、奇形が少なく、秀品率が高い。果重は200g程度。果色は濃いピンク色、グリーンベースは薄い。花数が多く、着果も良い。

3. 果実硬い 食味良好

ゼリー部が少なく果肉が多いため、果実は硬く、ずっしり重い。甘味が強く、酸味が少ないため食べやすい。

4. 早生

熟期は早生。節間はやや短い。あらゆる作型に向く。

栽 培 の 要 点

「定植後1ヶ月間の草勢を強く維持する」

1. 台木

草勢が強めの台木を使用する。青枯病が発生する圃場では「台本命」、褐色根腐れ病が発生する圃場では「あおおに」がお奨め。

2. 育苗・定植

極端な「しめ作り」や低温管理を避け、のびのび育て、草勢のある苗にする。定植は促成・夏秋はがく割れ、越冬・抑制は本葉4~5枚期の若苗とする。

3. 元肥

元肥の10a当たり窒素量は、越冬・促成・夏秋が15~23kg、抑制は0~10kgが目安。窒素よりも加里の成分量を多くすることにより、果実の肥大と色上がりの向上が期待される。土壌分析し、適正な施肥に努める。

4. 草勢管理

初期の草勢を確保するため、第1、第2花房は摘果する。促成・夏秋は3~4果、越冬・抑制は2~3果にする。

追肥開始が遅れないようにする。越冬・促成・夏秋が第3花房開花時、抑制が第2花房開花時から始める。夜温は9~10℃とし、節間が詰まりすぎる場合は夜温を上げる。

施 肥 例【エコファーマー対応】

(10a当たり)

肥料名	元肥	追肥
有機アグレット6-6-6	240~360kg	有機原料由来100%
草木加里	20~40kg	有機原料由来100%
はつらつ君6-6-6(液肥)		1回20kg 有機50%

成分量(kg/10a) 元肥 N:14~22 P₂O₅:14~22 K₂O:21~34

肥料名	元肥	追肥
有機アグレット6-6-6	0~160kg	有機原料由来100%
草木加里	0~20kg	有機原料由来100%
はつらつ君6-6-6(液肥)		1回20kg 有機50%

成分量(kg/10a) 元肥 N:0~10 P₂O₅:0~10 K₂O:0~16

比較表	草勢	早晩性	果形	果重(g)	果色	硬さ	食味
アニモ TY-12	中	早生	腰高	200	濃桃	硬	良
アニモ TY-10	やや強	中早生	腰高	210	濃桃	硬	良

適 作 型

